

LES PRINCIPAUX PARASITES INTERNES DU CHEVAL.



BOUCHE

Gasterophiles	Ulcères, salivation, gênes à la déglutition
---------------	---

ESTOMAC

Gasterophiles	Ulcères, coliques après les repas
Nématodes : habronèmes	Peu de lésions
Nématodes : Draschia	Nodules dans l'estomac

INTESTIN GRELE

Parascaris equorum (forme adulte)	En pelote. Risque de choc mortel (si infestation massive) après administration d' un vermifuge trop »fort » (privilégier les Benzimidazole)
Strongyloïdes westeri	Diarrhée (verdâtres) sur les POULAINS
Strongylus vulgaris (larves)	Artérite, infarctus paroi digestive
Anoplocéphale (Céstodes)	Assez rare.

CAECUM

Anoplocéphale	Beaucoup plus fréquent que dans l'IG. Coliques sur les poulains.
---------------	--

CAECUM ET COLON ASCENDANT

Grands strongles adultes	Lésions locales
Grands strongles larves	Nodules inflammatoires : coliques
Strongylus vulgaris (larves)	S'accumulent dans l'artère mésentérique : coliques mortelles.
Cyathostomes	Nodules inflammatoires. Si hypobiose, diarrhées+++ , amaigrissement lors de sorties massives de larves.

FOIE, PANCREAS ET PERITOINE.

Grands strongles : larves S edentatus et equinus	Hémorragies, nécrose, hépatite.
Parascaris equorum	Hémorragie foie
Grande douve	Cholangite mais rare

EXEMPLE DE QUESTIONS

Mme Le cuff est à l'accueil et souhaite un vermifuge pour son cheval.

•Pouvez-vous lui délivrer sans ordonnance?

Non, les vermifuges nécessitent une ordonnance pour pouvoir être délivrés.

•Quel examen le vétérinaire peut-il recommander? Quel est son intérêt?

La vermifugation doit être un acte raisonné. Il n'est pas recommandé de vermifuger tous les chevaux de manière systématique, mais d'adapter le protocole à chaque cheval.

La coproscopie permet de connaître les parasites présents chez le cheval et son niveau d'infestation. Savoir s'il est faiblement ou fortement excréteur de parasites.

•Quand faut-il vermifuger les chevaux idéalement?

Tous les chevaux doivent être vermifugés au moins une fois par an, au début de l'hiver (avant les premières gelées). Les autres vermifuges se font au cas par cas.

On vermifuge plus souvent les chevaux fortement excréteurs, les poulains de moins de 3 ans et les chevaux