Uvéite récidivante

Première cause de cécité chez le cheval

Inflammation de l'uvée (iris, corps ciliaire et choroïde)

La première crise est aiguë et peut évoluer vers une forme chronique

Prédisposition chez les Appaloosas

SIGNE D'APPEL :
OEIL FERME
PHOTOPHOBIE

Vice rédhibitoire



CLINIQUE

Blépharospasme : œil fermé, contraction des muscles palpébraux.
Epiphora : L'oeil coule plus ou moins abondamment.
Photophobie : la lumière devient douloureuse.
Myosis : pupille fermée
Oedème de paupières : gonflement autour de l'oeil.
Oedème de la cornée : un voile bleu sur l'oeil.
Changement de couleur de l'oeil : œil rouge ou jaune.

BAISSE DE LA VISION, CECITE DANS LES CAS GRAVES

Chaque crise est douloureuse et aggrave l'état de l'oeil

Complications : cataracte, glaucome, décollement de la rétine

Toute inflammation peut provoquer une rechute

CAUSES :
(Choc sur l'oeil
Intoxication)
Leptospirose +++
Maladie de lyme

TRAITEMENT :
Surtout symptomatique sauf si la cause est Connue (Leptospirose traitée aux AB
Soulager la douleur: corticoïdes (A PROSCRIRE EN CAS D'ULCERE)
Mydriatiques
Port d'un casque pendant les crises douloureuses
Mettre dans le noir et port d'un masque anti-mouche

Chirurgie : solution d'avenir
Vitrectomie (aspiration du corps vitré)
Implants de cyclosporine au niveau de la sclère

Source : Thèse Farfan Maëlle, Vetagro sup 2014