


ARTHROMYODYSPLASIES : Arcure (ou arqûre) qui est une déviation du genou/bouleture qui ne concerne que le boulet. Fréquemment arcure et bouleture sont associées.



Aplomb « normal »

Arcure

Bouleture

Arcure/bouleture

zone de tonte.

Rapidité d'intervention ? Pas d'urgence. Tant que le veau se déplace, des mesures simples peuvent régler ce trouble (mettre sur du fumier, vitamines AD3E et Sélénium), pose d'une attelle ou de semelles orthopédiques. Plus rarement il faut intervenir si le veau se blesse et ne peut plus se lever.

La pathologie. Origine incertaine (génétique, malposition utérine, carence...).

Raccourcissement ou rétraction des tendons fléchisseurs profond et superficiels des doigts d'où une flexion anormale du boulet, voire du paturon et du genou. Visible dès la naissance.

Synonyme : veau grenouille, veau bouleté, syndrome paturon, veau pied-bots mais le plus souvent : arcure/bouleture.

Matériel nécessaire.

Trousse classique de base. Surtout ne pas oublier la sonde cannelée.

Principe de la chirurgie.

Anesthésie : générale de courte durée.

Désinfection de la région sus-carpienne et métacarpienne après tonte de la face palmaire.

Bouleture : Ténotomie des fléchisseurs. Pratiquée à mi-canon. Il va falloir que vous pliez le doigt du veau afin de relâcher la tension sur les tendons puis que vous le remettiez en extension afin de rétracter les tendons après section.

Arcure : Myotomie des muscles ulnaires. Attention, lors de la névrectomie du nerf ulnaire, il va y avoir un fort soubresaut du membre qui peut vous surprendre.

Post-op et complications. Mise en place d'une gouttière et d'une résine pendant 15 jours. Le second membre est opéré au retrait du plâtre de la première intervention. Le pronostic est bon.