

<p>VELAGE</p> 	<p><u>Motifs d'intervention</u> : taille excessive du veau, mauvaise position, torsion utérine, gémellité, monstres... C'est une activité dominante pendant l'hiver en clientèle mixte ou rurale.</p> <p>Matériel : contrôlez toujours les stocks de casaque de vêlage, de gants et du lubrifiant utilisé dans la clinique. Chaque vétérinaire a ses habitudes.</p> <p>Vous assisterez rarement un vêlage (mais ça arrive, voir la photo), reportez vous au cours pour la description des différentes manœuvres obstétricales.</p> <p>Urgence : toujours y aller rapidement mais certains cas sont plus ou moins urgent (voir cours).</p>	<p>Conseils : En élevage allaitant, les éleveurs savent souvent gérer la situation, néanmoins vous pouvez dire : <i>Si le veau est gros, ne pas bricoler en essayant de « tirer un peu » avant l'arrivée du véto.</i> <i>Ne pas insister sur une mauvaise position du veau.</i> <i>Si le veau ne passe pas mais n'est pas engagé et coincé, repoussez le et levez la vache.</i> <i>Si le veau est coincé engagé et encore vivant, essayez en attendant le vétérinaire de mettre la vache en grenouille.</i> <i>Conseillez l'achat de lac de bonne qualité et montrez comment les poser correctement.</i></p>
<p>CESARIENNE</p> 	<p>Acte courant en pratique quotidienne <u>réservé</u> aux vétérinaires.</p> <p>Multiple indications : taille, position, veau emphysémateux, torsion 360 degrés...</p> <p>En élevage allaitant, la source de revenu est le veau, c'est donc une priorité de l'avoir vivant.</p> <p>Urgence : intervention rapide(1h/1h30 max). Voir avec l'éleveur si les eaux sont jetées.</p> <p>Connaître le matériel (chaque vétérinaire a sa propre trousse) : voir TD</p>	<p>Pour gagner du temps (l'acte en lui même dure 25 minutes) certains éleveurs pourront sur vos conseils :</p> <p><i>Avoir rasé le flanc gauche.</i> <i>Préparer deux seaux d'eau dont un tiède et des torchons.</i> <i>Préparer le site d'intervention (vache dans le piège à césarienne ou isolée si elle est à l'attache).</i></p>
<p>PROLAPSUS UTERIN</p>	<p>Expulsion de l'utérus après vêlage qui se retourne comme une chaussette.</p>	<p>A l'appel de l'éleveur : <i>Placer la vache dans des conditions calmes.</i> <i>L'isoler dans un box en veillant</i></p>

	<p>Veillez toujours au stocks. notamment des agrafes ou de bande de Buhner.</p> <p>Urgence : intervention rapide.</p>	<p><i>qu'elle ne se blesse pas la matrice sur un abreuvoir par exemple.</i></p> <p><i>Si elle est couchée, empêcher les autres d'approcher afin qu'ils ne la piétine pas.</i></p> <p><i>Ne pas chercher à délivrer.</i></p>
<p>PROLAPSUS VAGINAL</p>	<p>Recul du vagin dans le dernier tiers de gestation.</p> <p>Ce n'est pas une urgence mais prévoir l'intervention dans les 24 heures (souvent le vagin sortait et rentrait spontanément avant sa sortie définitive) .</p>	<p>Vous pouvez conseiller à l'éleveur de repousser le vagin. Si c'est impossible, le maintenir propre et faire venir le vétérinaire dans la journée car il va devenir dur et difficile à réintégrer.</p>
<p>EMBRYOTOMIE</p>	<p>Terme impropre : on découpe un fœtus, pas un embryon. C'est un choix alternatif à la césarienne si le veau est mort. Consiste à découper un veau mort afin d'en faciliter l'extraction. Les parties coupées dépendent des besoins (tête, bassin, pattes,...).</p> <p>Entretien de l'embryotome et surtout toujours avoir de la scié-fil d'avance (usure rapide).</p>	<p>Renvoyer le vétérinaire rapidement si la vache ne va pas bien dans les 48 heures qui suivent.</p>
<p>EPISIOTOMIE</p>	<p>Incision de la vulve afin de faciliter le passage du veau.</p> <p>Règle du 10 heure 10 à respecter afin de ne pas avoir de mauvaise déchirure..</p>	<p>Certains éleveurs les pratiquent eux même.</p> <p><i>Il faudra recoudre dans les 6 heures.</i></p>
<p>DECHIRURES</p>	<p>On peut avoir après le vêlage des déchirures de la vulve ou superficielles du vagin : pas grave, traitements locaux. Déchirures vaginales profondes</p>	<p>Pour une plaie de vulve : <i>utilisez des cicatrisants locaux.</i></p> <p>Pour une plaie plus profonde du vagin, <i>utilisez du Vagizan.</i></p> <p><i>Au moindre doute (plaie plus ou moins profonde, efforts expulsifs...), il vaut mieux</i></p>



		<i>passer voir.</i>
HEMORRAGIES	Quelques pertes de sang sont normales après le vêlage. Tout saignement abondant doit être considéré comme une urgence.	Suite à l'appel de l'éleveur. <i>Qu'il mette la main dans le vagin en cas de forte hémorragie et tente de pincer l'artère fermement (ou utiliser une pince car les doigts s'engourdissent vite) en attendant l'arrivée du vétérinaire qui va la suturer. Si le saignement n'est pas « artériel », mettre un chiffon propre dans le vagin.</i>
DELIVRANCE	Trois possibilités : Manuelle : elle doit être complète et sans saignements. Médicale : utilisation de Sergotonine ou de Wombyl. Attendre la chute spontanée. Voir cours pour voir les avantages et inconvénients.	Si un éleveur décide de ne pas délivrer manuellement, conseiller de <i>laisser un morceau de délivre sortir afin de drainer.</i>

De manière générale : Après un vêlage facile, une vache récupère rapidement. Tout désordre (anorexie, fièvre, agalactie, pertes anormales) doit nécessiter l'intervention d'un vétérinaire.